

## TUBOLOPATIAS I

- Nefropatía tubular intersticial secundaria tóxica:  
Necrosis tubular.

Nefropatía intersticial

Metales pesados, litio

- Nefropatía túbulo intersticial  
por obstrucción tubular:  
Hipercalcemia.

Mieloma múltiple.

Ácido úrico.

Hiperoxaluria.

Drogas.

- Nefropatía túbulo intersticial por infección:  
Pielonefritis aguda, crónica.

Tuberculosis.

Leptospirosis.

Otras.

- Nefropatía túbulo intersticial asociada  
a factores inmunológicos: Nefritis  
intersticial alérgica.

Síndrome de Sjögren.

- Nefropatías túbulo intersticial por  
enfermedades infiltrativas:  
Sarcoíidosis.

Leucemia.

Linfomas.

- Nefropatías túbulo intersticial diversas:  
Nefritis por radiación.

Nefropatía kaliopenica.

- Nefropatía obstructiva:  
Intrínseca (litiasis, coágulos, drogas, papilitis necrotizante, válvulas ureterales).

Extrínseca (vasos aberrantes, ligaduras accidentales de uréteros, fibrosis, neoplasias).

Otras ureterocele, fibrosis retroperitoneales, reflujo vesicoureteral.

## TUBULOPATIAS II

Padecimientos metabólicos y genéticos que afectan la función tubular:

- Cistinuria.
- Glicinuria.
- Trastornos paratiroideos: primario, secundario, raquitismo hipofosfatémico resistente a vitamina D.
- Síndrome de Fanconi: fructuosa, tirosinemia, galactosemia, cistinosis. • Enfermedad de Wilson, síndrome de Lowe, síndrome de Bartter..